

1

Avant le prélèvement, il est important d'avoir un **dialogue avec les parents**, de leur expliquer la nature de l'acte et ses objectifs. Remettez leur le dépliant "3 jours, l'âge du dépistage".

IMPORTANT : N'oubliez pas de recueillir le consentement écrit des parents pour le test génétique éventuel.

2

Les informations nominatives demandées sur la fiche de prélèvement sont capitales. Remplissez les soigneusement **au lit de l'enfant** (pour éviter toute erreur d'identification nominale). Installez-vous sur une surface propre pour éviter de salir la fiche. **N'utilisez pas de stylo à encre.**



3

Le dépistage de la drépanocytose n'est réalisé que chez les enfants à risque. (voir la drépanocytose dans le guide professionnel). **N'oubliez pas de cocher la case "À risque de Drépanocytose : Oui/Non"** et d'imprégner de sang tous les cercles du buvard lors de l'étape 7.



4

Installez confortablement le nouveau-né ; la position ventrale et la prise orale d'une solution d'eau sucrée minimisent la douleur.




5

Désinfectez la peau. Avant de piquer, laissez toujours bien sécher (ou essuyez avec une compresse stérile).

J3* Le jour du dépistage néonatal

*J3 : Après 72 h de vie ou au moins 48 h en cas de sortie précoce de la maternité.




9

Dès que le prélèvement est sec, **mettez-le dans l'enveloppe préimprimée** au nom du Centre Régional de Dépistage Néonatal (CRDN) et **postez-la le jour même.** Ceci est impératif. Tout retard dans la transmission du prélèvement peut entraîner un retard au diagnostic et au traitement d'un malade, ce qui peut être préjudiciable à son développement ultérieur...

8


Laissez sécher sur une surface propre non absorbante, à température ambiante, pendant 2 heures, loin d'une source de chaleur (soleil, radiateur, lampe à infrarouge...). Sinon, le sang pourrait être dénaturé et inutilisable par le laboratoire.

IMPORTANT : NOTEZ DANS LE CARNET DE SANTÉ QUE LES TESTS DE DÉPISTAGE ONT ÉTÉ EFFECTUÉS.




7

Laissez la goutte se former spontanément, et déposez-la en une fois dans le cercle (pas de dépôts successifs dans un même cercle) pour obtenir une imprégnation identique recto-verso. Il est parfois nécessaire de réaliser plusieurs piqûres. Cela peut vous paraître exagéré, mais n'oubliez pas que nous allons réaliser plusieurs dosages et que nous pouvons avoir à vérifier un premier résultat suspect avant de convoquer le bébé.



6

Pour la piqûre :
 • utilisez une lancette à pointe courte ;
 • piquez à la face interne ou externe du talon mais **jamais sa pointe** ;
 • piquez franchement.



PROGRAMME NATIONAL DE DÉPISTAGE NÉONATAL